


FEM NÄRINGSTYPER- innefattar 95% av landryggradsdjuren

KÖTTÄTARE (kräver animaliskt fett, kan ej bli vegetarianer, saknar sockersmak)

RP 30-60%, Fett 3-30%


- kattdjur, flertalet mårdjur (ej grävling)
- sälar, öronsälar, tand- och bardvalar
- igelkott, fladdermöss, mullvad, näbbmöss
- rovfåglar, insektsätande fåglar (som morkulla, svalor, småfåglar sommartid, nykläckta hönsfågelkycklingar)
- ormar, krokodiler, vattensköldpaddor
- grodor



ALLÄTARE (opportunister, kan leva vegetariskt)

RP 8-60%, Fett 2-25%

- hunddjur inkl räv, björnar
- flertalet primater
- svindjur
- råttor och möss
- kråk- och måsfågel, "vinterfåglar"
- papegojor, tamhöns
- änder, tranor vintertid




VÄXTÄTARE (utnyttjar bakterieenzym)

KVALITETSBETARE (ört- o bladätare)

RP 6-25% (VT↓, RP↑, lösliga kh↑, tanniner↓)


- giraff, kudu, dykarantiloper, dik-dik
- älg, rådjur, vitsvanshjort
- harar, sengångare
- näsapa, vrålapa, guerezor m fl,
- spetsnoshörning, tapirer
- jättepanda
- skogsfågel, grön leguan



SELEKTIVA BLANDÄTARE (opportunister, väljer fiberfattiga växter)

RP 7-23%

- flertalet hjortarter, ren, eland, springbock, visent, tama och vilda getter
- mindre kängurus
- präriehund, marsvin, lämmel, sorkar, kanin



GRÄS- OCH GROVFODERÄTARE (proteinkänsliga, storbukiga, oselektiva)

RP 5-15% (kvantitet↑, tanniner↓, VT↑)

- hästdjur, trubbnoshörning, elefanter
- sjökor
- kapybara, bäver
- stora kängurus, flodhäst
- davidshjort, gnu, blåsbock, oryx, addax, besoarantilop
- samtliga oxdjur, myskoxe, kameldjur
- vilda och tama får
- tjäder, gäss, struts
- landsköldpaddor

